

Ortiva Top



Ortiva Top

Sidst opdateret:
09.06.2020

Svampemiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer:

nr. 1-203

Pakkestørrelse:

5 l

Aktivstof:

200 g/l (18,2% w/w)

Azoxystrobin

125 g/l (11,4% w/w)

Difenoconazol

Kemisk Gruppe:

QoI

Triazole

Resistensgruppe:

Gruppe C2, "FRAC Code 11 (azoxystrobin)"|"Gruppe G1

FRAC kode 3 (difenoconazole)

Formulering:

Suspensionskoncentrat

Virkemåde:

Systemisk, Translaminar

Azoxystrobin er et bredspektret fungicid fra gruppen af strobiluriner. Azoxystrobin virker systemisk i planten og har desuden en bladgennemtrængende (translaminar) effekt. Midlet har primært en forebyggende effekt, men også en antisporulerende effekt på visse svampesygdomme. Difenoconazole er et systemisk triazol fungicid som giver kurativ og beskyttende effekt.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på friland i asparges, broccoli, blomkål, rosenkål, hovedkål, grønkål, kinakål, peberrod, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, salat, løg, porre, forårsløg, ærter (tørrede) samt agurk i drivhus.

Product CP: Tabs

- [Applicering](#)
- [Nødtelefon](#)

[Applicering](#)

Sprøjteteknik

Ortiva Top® skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion

Vandmængde

300-1500 l/ha

Regnfasthed

2 timer

[Nødtelefon](#)

- 82 12 12 12
-