



Amistar- det sikre valg i raps:


- ✓ **Foretrukket middel mod skulpesvamp og god effekt på knoldbægersvamp.**
- ✓ **Amistar fordeler sig systemisk i planten og beskytter ud i skulperne.**
- ✓ **Forgrønnede effekt giver længere frøindlejring og maksimerer olieindholdet.**
- ✓ **Hærder skulperne – minimerer opspring.**

SMMD1

0,35 Amistar + 0,45 Orius i fuld blomst, stadie 65

103 forsøg siden 2005,- rentabel i 12 ud af 13 år!

Anbefales også i år af flere konsulenthuse



Slide 2

SMMD1

Steenholt Mogensen Mogens DKCH, 23-Feb-20

Den nye løsning i raps

0,35 Amistar + 0,35 Propulse i fuld blomst, stadie 65

3 Aktivstoffer – Strobilurin/Triazol/SDHI

Topløsning mod skulpesvamp, knoldbægersvamp og lys bladplet




Svampebekæmpelse under blomstring.

Enkeltbehandling. Uddrag

- Amistar + Propulse - højeste NETTO-udbytte af alle relevante løsninger

+ 259 kr/ha ifht 0,7 Pictor Active

+ 206 kr/ha ifht 0,7 Propulse



Amistar anbefales i vårbyg til 2020 af SEGES

Svampestrategi vårbyg 2020


Stadie:	St. 31-33	St. 37-51	(St. 61-65)
Dosis:	25 procent dosis	25-50 procent dosis	25 procent dosis NB sprøjtefrister st. 61-69
Midler:	Prosaro m.fl.	Propulse + Comet Pro/Orius Max Amistar . Færre forsøg med Amistar. Prosaro + Comet Pro også ok, men pga resistens hos Ramularia mod triazoler foretrækkes Propulse. Balaya for dyr i byg.	Prosaro, Orius Max, Folicur Xpert

SEGES



09 164 2019 – Gennemsnit af 5 godkendte forsøg Afprøvning af forskellige svampemidler i vårbyg Uddrag – kun led med enkelt-behandlig st 37-39

Netto merudbytte hkg/ha



Amistar i vårbyg- effektiv & økonomisk

God effekt på alle relevante bygsygdomme

Anbefaling:

1 behandling:

0,35 l/ha Amistar + 0,5 l/ha Propulse i stadie 37-39

2 behandlinger:

1. 0,25-0,35 l/ha Prosaro eller FolicurXpert i stadie 31-33

2. 0,35 l/ha Amistar + 0,3-0,4 l/ha Propulse i stadie 37-39



syngenta